

เทคนิค
คู่มือการผลิต



“ลับปะรด”

คุณภาพ



คำนำ

บริษัท ครอบ ออกริเทค จำกัด ได้จัดทำหนังสือเทคนิคคู่มือการผลิตสับปะรด สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดและผู้สนใจ เพื่อเป็นประโยชน์ในการผลิตสับปะรดให้ได้คุณภาพ

โดยเป็นการแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เริ่มปลูกใหม่ไปจนถึงระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต การป้องกันกำจัดโรคพืชและแมลงศัตรูพืชต่างๆ รวมถึงวัชพืชในสับปะรด

โดยทางบริษัทฯ หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดและผู้สนใจทุกท่านได้นำไปใช้ บริษัทฯ ขอให้เกษตรกรทุกท่านประสบความสำเร็จในการปลูกสับปะรด

ด้วยความปรารถนาดีจาก
บริษัท ครอบ ออกริเทค จำกัด ตราดาวใบไม้



สารบัญ

วิธีการบำรุงต้นสับปะรด

ระยะหลังปลูกใหม่ , ระยะขยายสะโพก

ระยะบังคับดอก/หยุดแก๊ส , ระยะดอกแดง

ระยะดอกม่วงโรย (หลังแคะจุก) , ระยะก่อนเก็บเกี่ยว 30 วัน

1

2

3

4

โรคต่างๆ ของต้นสับปะรด

รากเน่า โคนเน่า

5

6

แมลงศัตรูของต้นสับปะรด

เพลี้ยแป้ง

7

8

สารกำจัดวัชพืช

9



วิธีการบำรุง
ต้นสับปะรด

ระยะหลังปลูกใหม่

(เร่งต้น เร่งการแตกรากและใบใหม่ ต้นโตไว)



1



หรือ



2



3



- 1 • เทอร์ริฟิค 30-12-12 หรือ เทอร์ริฟิค 20-20-20 : 1.5-2 กิโลกรัม
- 2 • เจเนอเรต : 1 ลิตร
- 3 • โรเฟิล : 1 ลิตร

ระยะขยายสะโพก

(สะสมอาหาร พร้อมบังคับดอก)



1



2



3



- 1 • เทอร์ริฟิค 6-12-36 : 1.5-2 กิโลกรัม
- 2 • เวทคัลโบ : 1 ลิตร
- 3 • ไชโตกรีน-วี : 1 ลิตร

*ทุกอัตราแนะนำผสมน้ำ 1,000 ลิตร

ระยะบังคับดอก/หยุดน้ำแก๊ส (กระตุ้นการออกดอก)



- 1 • เวทรีฟอน52 : 200-300 ซีซี ผสมยูเรีย 10 กิโลกรัม
- 2 • เวทคัลโบ หรือ วีพียู : 1 ลิตร



ระยะดอกแดง (ขยายดอก ขยายตา เพิ่มความสมบูรณ์)



- 1 • เทอริฟิก 6-12-36 : 1.5-2 กิโลกรัม
- 2 • เวทคัลโบ : 1 ลิตร



ระยะดอกม่วงโรย (หลังแคะจุก)

(ขยายตา ขยายลูก ผลใหญ่)



- 1 • เทอร์ฟิค 13-5-30 : 1.5-2 กิโลกรัม
- 2 • เวทคัลโบ : 1 ลิตร
- 3 • เจเนอเรต : 1 ลิตร

ระยะก่อนเก็บเกี่ยว 30 วัน

(ผลใหญ่ เนื้อแน่น น้ำหนักดี)



- 1 • โคคุน : 1 ลิตร
- 2 • เวทแคล40 หรือ โพลว์ : 1 ลิตร

A large, horizontal, orange brushstroke graphic with a textured, painterly appearance, centered on the page. The stroke is irregular and has a rough, feathered edge.

โรคต่างๆ ของ
ต้นสับปะรด

โรครากเน่า โคนเน่า (สาเหตุจากเชื้อรา Phytophthora sp.)



ก่อนปลูก

1



หรือ



หลังปลูก

2



หรือ



1. ชุบน้ำก่อนปลูก อีโฟไซด์ : 80-100 กรัม หรือ ไทม์ไลน์2008 หรือ อาร์เมอร์: 100 ซีซี หรือ เวทแลกซิล: 30-40 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร
2. ฉีดพ่นหลังปลูก อีโฟไซด์ 80-100 กรัม หรือ เวทแลกซิล 20-30 กรัม หรือ ไทม์ไลน์2008 หรือ อาร์เมอร์ 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

*ทุกอัตราแนะนำผสมน้ำ 1,000 ลิตร

A large, horizontal, red brushstroke graphic with a textured, painterly appearance, centered on the page. The stroke is thick and has irregular, feathered edges, creating a sense of movement and energy. It serves as a background for the main title text.

แม่ลูกศัตรูของ
ต้นลับปะรด

เพลี้ยแป้ง

(Mealybug *Pseudococcus longipinus*)



• เพลี้ยแป้ง จะอาศัยดูดกินน้ำเลี้ยงอยู่บริเวณซอกใบ โคนต้น และลำต้น ทำให้ต้นและใบค่อยๆแห้ง ถ้าระบาดมากอาจทำให้ต้นสับปะรดตาย มีมดช่วยในการเคลื่อนที่ไปยังส่วนต่างๆ ของพืชและเพลี้ยแป้งเป็นพาหะในการถ่ายทอดโรคเหี่ยว (โรคน้ำแฉะ) ที่เกิดจากเชื้อไวรัส

1



2



3



- 1 • โดโน50 อัตรา 1,000 ซีซี
- 2 • ไบโอไซด์-วี อัตรา 500-1,000 ซีซี
- 3 • เวทพาราگون อัตรา 500-1,000 ซีซี



- เวททราซีน อะทราซีนในรูปเม็ด ละลายน้ำดีเยี่ยม ใช้ควบคุมวัชพืช ก่อนงอกทั้งใบกว้างและใบแคบ



- เวทมีทริน อะมีทรินในรูปเม็ด ละลายน้ำดีเยี่ยม ใช้ควบคุมวัชพืชหลังงอกทั้งใบกว้างและใบแคบ




- วีไดยู ชนิดผง ละลายน้ำดีเยี่ยม ใช้ควบคุมวัชพืชก่อนงอกและหลังงอกทั้งใบกว้างและใบแคบ



ธุรกิจของท่าน คืองานของเรา

ติดตามเราได้ที่ | 

www.cropagritech.com

 : ดาวใบไม้





บริษัท ครอบ อะกริเทค จำกัด
28/92 หมู่ 4 ต.เจ้จันทนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2575-5777-86 โทรสาร 0-2575-5790

